

DUSPATALIN®

MEBEVERINA



- El Síndrome de Intestino Irritable es una alteración común del tracto gastrointestinal que afecta entre el 10% y 20% de la población adulta a nivel mundial.¹
- En esta revisión sistemática¹ se demostró que mebeverina es eficaz en:
 - Disminuir el dolor y malestar abdominal.
 - Disminuir la distensión abdominal.
 - Disminuir hábitos intestinales anormales e hinchazón.
 - Mejorar la frecuencia y consistencia de las heces.

Búsqueda sistemática en las principales bases de datos médicas electrónicas, PubMed, EMBASE y Cochrane, desde enero de 1965 hasta enero de 2021 para estimar los efectos del tratamiento de la mebeverina en pacientes con SII. Los criterios de inclusión fueron: pacientes con diagnóstico de SII; tratamiento con mebeverina (independientemente de la dosis y la duración); resultados específicos (dolor o malestar abdominal, distensión abdominal, hábitos intestinales anormales, hinchazón, estreñimiento, diarrea, frecuencia y consistencia de las deposiciones, náuseas, ansiedad y depresión); estudios (experimentales u observacionales) incluyendo diez pacientes; y estudios publicados en inglés. Estudios que involucran tratamiento con mebeverina en combinación con otro fármaco, terapia cognitiva o dieta, así como estudios de casos o estudios secundarios fueron excluidos del estudio.¹

Indicado en: Tratamiento sintomático de dolores y malestar intestinal, asociados con alteraciones del tubo digestivo y de las vías biliares*

*Folleto de Información al Profesional Duspatalin 25 de Marzo 2021

1: Daniluk J et al. The Efficacy of Mebeverine in the Treatment of Irritable Bowel Syndrome—A Systematic Review J. Clin. Med. 2022, 11, 1044

Material para uso exclusivo de profesionales de la Salud. Abbott, Av. Carrascal 5670, Quinta Normal. Santiago - Chile
CHL2342486

