



Abbott

ÁCIDO VALPROICO GUÍA PARA LOS PACIENTES MASCULINOS CAPACES DE CONCEBIR UN HIJO.

Lea esta guía junto con el folleto de información al paciente
para obtener la información completa del producto.

ÁCIDO VALPROICO

LO QUE DEBERÍA SABER

Esta guía contiene información clave sobre el riesgo potencial
al concebir un hijo si recibe tratamiento con Ácido Valproico.
Si tiene alguna duda o pregunta consulte a su médico o farmacéutico.

CONSERVE ESTA GUÍA. ES POSIBLE QUE TENGA QUE VOLVER A LEERLA.

Material dirigido a profesional de la salud para sus pacientes con prescripción de producto
Abbott, con fines informativos y de apoyo en diagnóstico y tratamiento de sus pacientes.

Abbott, Av. Carrascal 5670, Quinta Normal, Santiago - Chile
CHL2320441

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE TOMAR ÁCIDO VALPROICO AL CONCEBIR UN HIJO(A)?

Un estudio sugiere que, si toma Ácido Valproico durante los 3 meses previos a la concepción, su hijo(a) puede tener un mayor riesgo de sufrir un deterioro en el desarrollo mental y/o motriz en comparación con los niños nacidos de padres que usaron la motrigna o levetiracetam, otros medicamentos que pueden ser utilizado para tratar su enfermedad.

En este estudio, alrededor de 5 niños de cada 100 padecían estos trastornos cuando nacieron de padres tratados con Ácido Valproico, y alrededor de 3 niños de cada 100 cuando nacieron de padres tratados con otros medicamentos.

No existen datos sobre este riesgo potencial para los niños concebidos después de 3 meses a continuación de la suspensión del tratamiento con el Ácido Valproico (el tiempo necesario para que se formen nuevos espermatozoides).

¿Qué significa esto para mí?

Su médico analizará con usted (y/o con sus padres/cuidador(a)) el riesgo potencial de concebir un hijo si recibe tratamiento con el Ácido Valproico y las precauciones asociadas con el uso del Ácido Valproico:

- La necesidad de utilizar un **método anticonceptivo** eficaz (control de la natalidad) para usted y su pareja durante el tratamiento, así como en los 3 meses posteriores a la suspensión de la administración del Ácido Valproico.
- La necesidad de consultar a su médico para **analizar las opciones de tratamiento alternativas**, tan pronto como planee concebir un hijo(a) y antes de suspender la anticoncepción (control de la natalidad).
- **No donar espermatozoides** durante el tratamiento y durante los 3 meses posteriores a su finalización..

Si su **pareja queda embarazada** mientras usted usó Ácido Valproico en los 3 meses anteriores a la concepción, ambos deben **comunicarse con el médico** para recibir asesoramiento.

No interrumpa su tratamiento sin hablar con su médico. Si interrumpe su tratamiento, sus síntomas pueden empeorar.

Debe **programar citas periódicas** con su médico.

**CONSULTE EL FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
PARA OBTENER UNA INFORMACIÓN MÁS DETALLADA**

Material dirigido a profesional de la salud para sus pacientes con prescripción de producto Abbott, con fines informativos y de apoyo en diagnóstico y tratamiento de sus pacientes.

Abbott, Av. Carrascal 5670, Quinta Normal, Santiago - Chile
CHL2320441

