



Abbott

Niofen®FORTE
SUSPENSIÓN ORAL

- PARA EL **ALIVIO SINTOMÁTICO** A CORTO PLAZO DE **FIEBRE**
- **DOLOR LEVE A MODERADO** TALES COMO:

dolor de cabeza, incluyendo dolores de cabeza asociados a la migraña, neuralgia, dolor de muelas, dolor muscular y de articulaciones, dolor de espalda, dolor menstrual y dolores del resfrío común¹

EDAD/PESO	FRECUENCIA	DOSIS ÚNICA	DOSIS MÁXIMO DIARIO
10-15 Kg (Infante/Niños; 1-3 Años)	3 veces al día	2,5 mL (100 mg)	300 mg
16-19 Kg (Infante/Niños; 4-5 Años)	3 veces al día	3,75 mL (150 mg)	450 mg
20-29 Kg (Infante/Niños; 6-9 Años)	3 veces al día	5 mL (200 mg)	600 mg
30-39 Kg (Infante/Niños; 10-11 Años)	3 a 4 veces al día	5 mL (200 mg)	800 mg

Niofen® Forte Suspensión Indicación: Para el alivio sintomático a corto plazo de Fiebre, dolor leve a moderado, tales como dolor de cabeza, incluyendo dolores de cabeza asociados a la migraña, neuralgia, dolor de muelas, dolor muscular y articulaciones, dolor de espalda, dolor menstrual y dolores del resfrío común.

*Ficha técnica aprobada por el ISP.

27
AÑOS
Experiencia
clínica

AGRADABLE
SABOR
FRUTAL




¿CUANTO TE DUELE?

LA ESCALA VISUAL ANALÓGICA

Se conoce también como **escala facial de Wong y Baker**. Se utiliza sobre todo en la edad pediátrica y muestra la representación de una serie de caras con diferentes expresiones que van desde la alegría al llanto, a cada una de las cuales **se le asigna un número del 0 (no dolor) al 6 (máximo dolor)**.

El paciente tiene que indicar la cara que mejor representa la intensidad de su dolor en el momento del examen.



0: no dolor **2:** dolor leve **4-6:** dolor moderado **8:** dolor intenso **10:** máximo dolor imaginable

Referencia: adaptado de ¿Cómo se evalúa el dolor en los niños? (s/f). Aeped.es.
Recuperado el 19 de abril de 2024, de <https://enfamilia.aeped.es/temas-salud/como-se-evalua-dolor-en-ninos>