

## ▶ DERMATOLOGY

### HYALSENSE®

Ácido Hialurónico

Inyectable

Fine plus, Ultra Plus, Sub Q plus

Gel fisiológico estéril de ácido hialurónico reticulado de origen no animal, libre de pirógenos con adición de 0.3% lidocaína clorhidrato.

Su finalidad de uso es para el aumento de tejido facial.

La adición de lidocaína produce un efecto de alivio del dolor durante el tratamiento.\*



\* Mayor información consultar prospecto interno del producto.



Abbott



## VADEMECUM DERMATOLOGY

Este portafolio de productos Abbott incorpora alternativas para el efectivo manejo de patologías como virus herpes, alopecia, dermatosis y otros relacionados con el campo de la medicina estética.

Vadiral®  
VALACICLOVIR

APEPLUS®  
FINASTERIDA

FLUSONA®  
CREMATORICA 0,05% FLUCASONA PROPIONATO

Reage®  
FORMA BOTANICA TPO A

Hyalsense  
ACIDO HIALURONICO RETICULADO

## DERMATOLOGY

### VADIRAL®

Valaciclovir

1000 mg

5 comprimidos y 21 comprimidos

Tratamiento de episodios iniciales de herpes genital en adultos inmunocompetentes.

Supresión de episodios recurrentes de herpes genital en adultos inmunocompetentes.

Tratamiento de herpes zoster en adultos inmunocompetentes.

Tratamiento de herpes labial.\*



### APEPLUS®

Finasterida

1,00 mg

30 comprimidos y 90 comprimidos

Tratamiento de alopecia androgénica en varón adulto.\*



\* Indicaciones aprobadas en Folleto al Profesional en Chile por ISP.

## DERMATOLOGY

### FLUSONA CREMA®

Fluticasona propionato

0,05%

15 gramos

Tratamiento de dermatosis inflamatorias:

Indicado para adultos y niños sobre 3 meses de edad para el alivio de las manifestaciones inflamatorias pruríticas en dermatosis sensibles a corticoides.

Reducción del riesgo de recurrencia del eczema atópico crónico, una vez que el episodio agudo ha sido tratado efectivamente.\*



### REAGE®

Letibotulinum toxin Tipo A.

50 unidades, 100 unidades, 200 unidades

El uso de este medicamento está indicado en el tratamiento de:

- Líneas glabellares
- Blefaroespasmos
- Espasticidad de las extremidades superiores en pacientes adultos, post accidente cerebrovascular.
- Espasticidad focal asociada con la deformidad dinámica del pie equino producida por espasticidad en pacientes pediátricos ambulatorios con parálisis cerebral, de 2 o más años de edad.\*



\* Indicaciones aprobadas en Folleto al Profesional en Chile por ISP.